



中华人民共和国水产行业标准

SC/T 1015—2006
代替 SC/T 1015—1989

鲢、鳙催产技术要求

Technical demand for the induced spawning of
silver carp and bighead carp

2006-01-26 发布

2006-04-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前　　言

本标准是对 SC/T 1021—1989《鲢鱼、鳙鱼亲鱼催产技术要求》的修订。修订时内容：合并表 2 与表 3；增加催产剂种类“地欧酮”和“促排卵素 2 号、3 号”；同时，对催产剂剂量作了相应修改与补充，并将附录 B 的内容纳入标准正文中。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部渔业局提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会淡水养殖分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国水产科学研究院长江水产研究所、浙江省淡水水产研究所。

本标准主要起草人：徐忠法、周瑞琼、沈仁澄、何力、杨国梁。

鲢、鳙催产技术要求

1 范围

本标准规定了鲢(*Hypophthalmichthys molitrix*)、鳙(*Aristichthys nobilis*)催产的环境条件、亲鱼选择、催产剂的使用及人工授精方法。

本标准适用于鲢、鳙人工催产与人工授精。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 5055 青鱼、草鱼、鲢、鳙 亲鱼

GB 11607 渔业水质标准

3 环境条件

3.1 催产季节

春末夏初,当水温回升并稳定在18℃以上时,方可进行人工繁殖。不同地区的人工繁殖季节见表1。

表1 不同地区的人工繁殖季节

地 域	人工繁殖季节
珠江流域	4月上旬至5月中旬
长江流域	5月上旬至6月上旬
黄河流域	5月中旬至6月下旬
黑龙江流域	6月中旬至7月中旬

3.2 催产水温与水质

鲢、鳙催产的水温为18℃~30℃,适宜水温为22℃~28℃。水源充足,水质应符合GB 11607的规定。

3.3 产卵池

各种类型的产卵池,应保持1m~1.5m水位和一定的水交换量。

4 繁殖亲鱼的选择

4.1 亲鱼质量

鲢、鳙亲鱼质量应符合GB/T 5055的规定。

4.2 雌亲鱼的选择

4.2.1 外观选择

性成熟雌鱼的腹部膨大,有明显的卵巢轮廓。泄殖孔附近饱满松软、有弹性,泄殖孔微红、不突出。

4.2.2 挖卵检查

用挖卵器伸入亲鱼泄殖孔,挖取少许卵粒,置于培养皿中或载玻片上观察,成熟卵粒分散、大小整齐、饱满。再滴加卵球透明液(参见附录A),经2min~3min后观察,全部或绝大多数卵核偏位。

4.3 雄亲鱼的选择

轻压雄鱼后腹部,有乳白色精液从泄殖孔流出,遇水后迅速散开。

4.4 配组

雌、雄亲鱼比例为1:1~1.2。

5 催产剂的使用

5.1 催产剂种类

常用鲢、鳙催产剂有:

- 鱼用绒毛膜促性腺激素(HCG);
- 鱼用促黄体素释放激素类似物(促排卵素2号LRH-A₂、促排卵素3号LRH-A₃);
- 多巴胺受体拮抗物地欧酮(DOM)。

5.2 催产注射液的配制

5.2.1 鱼用绒毛膜促性腺激素注射液

用0.8%生理盐水溶解后稀释即成。现配现用。

5.2.2 鱼用促黄体素释放激素类似物注射液

用0.8%生理盐水溶解后稀释即成。

5.2.3 多巴胺受体拮抗物地欧酮注射液

将所需剂量的DOM置于干燥研钵中,加入少许0.8%生理盐水研成糊状,再稀释至所需量。现配现用。用时摇匀。或直接用DOM水剂。

5.3 注射部位

胸鳍或腹鳍基部腹腔注射。

5.4 雌亲鱼的注射剂量

5.4.1 两次注射法的剂量

鲢、鳙催产以两次注射为宜,以两种药物混合注射为好。两次注射法的催产剂与剂量见表2。

表2 两次注射法的催产剂与剂量

注射方式		催产剂剂量		
		LRH-A ₂ 或LRH-A ₃ μg/kg	HCG IU/kg	DOM mg/kg
第一次注射 ^a	第一种	0.2~0.6	—	—
	第二种	—	100~200	—
第二次注射 ^a	第一种	2~4	—	—
	第二种	—	800~1 200	—
	第三种	2~4	800~1 200	—
	第四种	2~4	—	3~5

^a任选一种剂量。

两次注射的时间间隔与效应时间相同,见表3。

5.4.2 一次注射法的剂量

按表2中所规定的第二次注射剂量,任选一种一次注入鱼体。

5.5 雄亲鱼的注射剂量

雌亲鱼如采用两次注射法,当雌亲鱼注射第二次时注射雄亲鱼;雌亲鱼如采用一次注射法,雄亲鱼与雌亲鱼同时注射。剂量为雌亲鱼注射剂量的一半。

6 产卵和受精

6.1 效应时间

从注射催产剂到亲鱼产卵的时间称为效应时间。效应时间随水温呈规律性变化,不同水温条件下的效应时间见表3。

表3 效应时间

单位为小时

水温℃	一次注射法	两次注射法
20~21	16~18	11~12
22~23	14~16	10~11
24~25	12~14	8~10
26~27	10~12	7~8
28~29	9~11	6~7

6.2 受精

6.2.1 自然受精

亲鱼注射催产剂后,让其在产卵池中自行产卵、排精,使精、卵在水中自行结合受精。

6.2.2 人工授精

根据水温推算效应时间,及时取卵、取精,盛放精、卵的器皿应干燥洁净,精、卵避免阳光直射。所取精、卵在人工搅拌下,使之结合受精。一般采用干法和半干法两种。

——干法授精:把所取精、卵混合,再加水搅拌1 min~2 min,使之受精。

——半干法授精:先用0.8%生理盐水稀释精液,然后与卵混合,再加水搅拌1 min~2 min,使之受精。

附录 A
(资料性附录)
卵球透明液配制方法

95%酒精:95份;
10%福尔马林:10份;
冰乙酸:5份;
三者按上述比例混合即成。

中华人民共和国

水产行业标准

鲢、鳙催产技术要求

SC/T 1015—2006

* * *

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码：100026 网址：www.ccap.com.cn)

中国农业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

* * *

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 0.75 字数 7 千字


2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月北京第 1 次印刷

书号：16109·700 印数：1~1 000 册

定价：10.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 65005894



SC/T 1015-2006